

くすりのしおり

注射剤

2019年12月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：アコアラン静注用 1800

主成分：アンチトロンビンガンマ（遺伝子組換え）（Antithrombin gamma (Genetical recombination)）

剤形：注射剤

シート記載：



この薬の作用と効果について

血液が過剰に固まることを阻害し、血液凝固機能を正常に戻します。

通常、先天性アンチトロンビン欠乏に基づく血栓形成傾向、アンチトロンビン低下を伴う播種性血管内凝固症候群（DIC）の治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。以前にこの薬の成分や、他のアンチトロンビン III 製剤を使用して、ショックを起こしたことがある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・通常、ゆっくり静脈内に注射、または点滴で静脈内に注射します。
効果を見ながら使用期間を決めています。具体的な使用期間については医師にお聞きください。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、消化管出血（胃腸出血、下血）、皮下出血、その他の出血（血管穿刺部位血腫、血尿など）などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・呼吸困難、胸内苦悶（しめ付けられるような胸の痛み）、喘鳴（ヒューヒュー音） [ショック、アナフィラキシー]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。