

効能・効果追加のご案内

血漿分画製剤（液状・静注用免疫グロブリン製剤）

献血ヴェノグロブリン[®]IH10

（生物学的製剤基準 ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン）

5%静注

0.5g/10mL, 1g/20mL, 2.5g/50mL
5g/100mL, 10g/200mL

10%静注

0.5g/5mL, 2.5g/25mL, 5g/50mL
10g/100mL, 20g/200mL

2019年12月

一般社団法人
日本血液製剤機構

謹啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、弊機構が製造販売するポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン「献血ヴェノグロブリンIH5%静注・10%静注」につきまして、下記の通り、新たな効能・効果が承認されましたのでご案内申し上げます。

今後とも一層のご高配のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

承認内容

●「効能・効果」の追加内容

抗ドナー抗体陽性腎移植における術前脱感作

●「用法・用量」の追加内容

献血ヴェノグロブリンIH 5%静注

・抗ドナー抗体陽性腎移植における術前脱感作：

通常、人免疫グロブリンGとして、1日あたり1,000mg (20mL)/kg体重を点滴静注する。ただし、患者の年齢及び状態に応じて適宜減量する。なお、総投与量は4,000mg (80mL)/kg体重を超えないこと。

献血ヴェノグロブリンIH 10%静注

・抗ドナー抗体陽性腎移植における術前脱感作：

通常、人免疫グロブリンGとして、1日あたり1,000mg (10mL)/kg体重を点滴静注する。ただし、患者の年齢及び状態に応じて適宜減量する。なお、総投与量は4,000mg (40mL)/kg体重を超えないこと。

※警告、禁忌を含む使用上の注意等につきましては、最新の添付文書をご参照ください。

お問い合わせ先

一般社団法人 日本血液製剤機構 くすり相談室

〒105-6107 東京都港区浜松町2-4-1

電話 0120-853-560（日本血液製剤機構営業日 9:00～17:30）